



## Corylopsis sp

### INFORMATION

---

**Famille :** Hamamelidaceae

**Etymologie :** Corylopsis, appartient au groupe des Corylus (noisetiers).

**Origine :** Chine – Japon. Certaines variétés sont communes dans l'Himalaya.

**Langues :** CAST. Falso avellano, corilopsis CAT. corilopsis, ANG. Winter hazel, ALE. Scheinhasel, FRA. faux noisetier.

**Caractéristiques :** Dans la nature, c'est un arbuste à dimensions réduites, similaire au noisetier. Avant le bourgeonnement printanier, il développe des grappes pendantes très attractives : ce sont les fleurs masculines. Les fleurs féminines passent inaperçues. Il possède des feuilles simples, ovales et dentées, avec les nerfs très marqués.

### SITUATION

---



À l'extérieur, à mi-ombre ou en plein soleil. Éviter les longues expositions en plein soleil pendant l'été.

### ARROSAGE

---



Modéré, bien qu'une humidité constante dans le substrat doit être maintenue.

### FERTILISATION

---



Printemps et automne. En été, il est recommandé de ne pas fertiliser.

### REMPOTAGE

---



Tous les 2-3 ans, en automne ou à la fin de l'hiver.

Substrat : Akadama 100% ou mélangée avec du gravier volcanique (30% de gravier).

### TAILLE, PINCEMENT ET LIGATURE

---



**Taille :** Les tailles de structure peuvent être réalisées en hiver, lorsque l'arbre est sans feuilles et il est plus facile de prévoir le résultat.

**Pincement :** Laisser grandir les nouvelles pousses jusqu'à 5-6 feuilles et pincer les pointes. Le pincement peut affecter la floraison, il est donc recommandé de laisser grandir les branches dans la mesure du possible.

**Ligature :** Printemps-été.

### CURIOSITÉS

---

Très utilisé en jardinerie en l'agroupant avec des plantes du genre Forsythia, caractérisées, tout comme le Corylopsis, par leur floraison précoce, à la fin de l'hiver.