



Pseudolarix amabilis

INFORMATION

Famille : Pinaceae

Synonymes : Laricopsis kaempferi, Chrysolarix amabilis.

Origine : Est de la Chine.

Langues : Cast.: Falso alerce, Ang.: Golden-larch, Al.: Goldlärche.

Caractéristiques : Conifère à feuilles caduques de dimensions modestes. Croissance modérée-lente. L'écorce, très jolie, est de couleur marron grisâtre, et se lézarde au fil des années. Feuilles composées, très flexibles, couleur verte brillante ; en automne, elles acquièrent une tonalité dorée très attractive.

SITUATION



A l'extérieur, à mi-ombre ou en plein soleil.

ARROSAGE



Abondant, surtout en été. Les pointes des nouvelles feuilles se "brûlent" avec facilité au moment où il lui manque de l'eau, encore plus s'il est situé en plein soleil.

FERTILISATION



Du printemps à l'automne. En été, il peut continuer d'être fertilisé mais en fréquence moins importante. En général, tous les 20-30 jours selon l'engrais.

REMPOTAGE



Tous les 2-3 ans, au début du bourgeonnement printanier. Pour les vieux exemplaires, nous pouvons arriver jusqu'à 5 ans sans repoter.

Substrat : 100% Akadama ou mélangé avec 30% de gravier volcanique. On peut utiliser de la tourbe dans le mélange puisque c'est un arbre qui préfère les substrats acides.

TAILLE, PINCEMENT ET LIGATURE



Taille : les tailles de structure peuvent se réaliser en hiver, quand l'arbre est sans feuilles et il est plus facile de prévoir le résultat.

Pincement : les nouveaux bourgeons se coupent quand ils sont encore ternes, à travers le pincement. Il est également possible de le laissez plus, et arrivé à l'hiver, couper à la hauteur du premier et second bourgeon.

Ligature : à la fin de l'été et en automne.

CURIOSITÉS

Il existe différentes cultures intéressantes. La variété "nana" est très répandue dans le monde du bonsaï