



## Cotoneaster sp.

### INFORMATION

---

**Famille :** Rosacée

**Synonymes :** Pyracantha Roem., Crataegus L., Mespilus L.

**Origine :** Régions tempérées d'Europe, Afrique et surtout Asie.

**Langues :** Fr.: Cotonnier, Jap.: Benishitan, sharintoo, edauchisharintoo, shitanju.

**Caractéristiques :** Arbuste à feuilles caduques ou persistantes selon l'espèce. Il produit des fleurs blanches ou roses et ses fruits sont petits et de couleurs rouges. Il en existe plus de 100 espèces.

### SITUATION

---



Dans le climat méditerranéen, à l'extérieur toute l'année. Dans les zones plus froides, il faut le protéger des gelées.

### ARROSAGE

---



Abondant en été et modéré en hiver.

### FERTILISATION

---



Printemps et automne, jamais pendant la floraison.

### REMPOTAGE

---



Tous les deux ans, au début du printemps.

Substrat : 100% Akadama ou mélangé avec 20% de gravier volcanique (Pouzzolane).

### TAILLE, PINCEMENT ET LIGATURE

---



Taille : au début du bourgeonnement printanier.

Pincement : en coupant à deux feuilles, lorsque le bourgeon a développé 6 à 8 feuilles.

Ligature : on peut le faire toute l'année.

### CURIOSITÉS

---

Le Cotoneaster, avec plus de 100 espèces et de nombreuses variétés, est utilisé en jardinage pour former des haies, ou en arbre isolé. Ceci est dû à sa bonne réaction aux tailles, sa rusticité et son abondance de fleurs et de fruits de diverses couleurs, variant selon l'espèce. Pendant beaucoup de temps, on lui a donné de nombreux noms botaniques différents, jusqu'à ce qu'on lui octroie la catégorie de genre, le libérant du genre pyracantha auquel il était associé.